I肺がん24

対象疾患	非小細胞肺がん	レジメン名	CBDCA+S-1療法
1コースの期間（休薬期間含む）		21日	
総コース数	6コース		

Rp.	薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
1	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム（S-1）	※備考欄参照	経口		day 1~14
2	生食100 mL（ルートキープ用）	1 P	点滴静注	ゆっくり	day 1
3	生食100 mL	1 P	点滴静注	30分	day 1
	デキサメタゾン6.6 mg	1 V			
	デキサメタゾン1.65 mg	2 A			
	パロノセトロン0.75 mg	1 V			
4	デキサメタゾン4 mg	2 T	経口		day 2~3（Max day 2~4）
5	カルボプラチン（CBDCA）	AUC 5	点滴静注	60分	day 1
	5%ブドウ糖注射液250 mL	1 P			
6	生食50 mL（フラッシュ用）	1 P	点滴静注	全開	day 1

血管外漏出リスク分類	CBDCA：炎症性
催吐性リスク分類	レジメン全体：中等度（S-1: 軽度　CBDCA: 中等度）
インラインフィルターの要不要	不要
備考欄	※CBDCA投与量計算は、Calvert式（投与量$_{(mg)}$=目標AUC$_{(min・mg/mL)}$×（GFR$_{(mL/min)}$+25））を用いる。 ※S-1投与量は以下の通りである（いずれも1日2回朝夕食後の分2投与）。 BSA<1.25 m^2: 80 mg/day、1.25≦BSA<1.5 m^2: 100 mg/day、1.5 m^2≦BSA: 120 mg/day