

B胃がん8

対象疾患	胃がん	レジメン名	S-1+CPT-11療法（IRIS療法）		
1コースの期間（休薬期間含む）	35日				
総コース数	制限なし				
Rp.	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム (S-1)	※備考欄参照	経口		day 1~21
2	生食100 mL（ルートキープ用）	1 P	点滴静注	ゆっくり	day 1、15
3	生食100 mL	1 P	点滴静注	30分	day 1、15
	デキサメタゾン6.6 mg	1 V			
	デキサメタゾン1.65 mg	2 A			
	パロノセトロン0.75 mg	1 V			
4	デキサメタゾン4 mg	2 T	経口		day 2~3 (Max day 2~4) day 16~17 (Max day 16~18)
5	イリノテカン（CPT-11）	80 mg/m ²	点滴静注	90分	day 1、15
	生食250 mL	1 P			
6	生食50 mL（フラッシュ用）	1 P	点滴静注	全開	day 1、15
血管外漏出 リスク分類	CPT-11:炎症性				
催吐性リスク分類	レジメン全体:中等度(S-1:軽度 CPT-11:中等度)				
インラインフィルター の要不要	不要				
備考欄	※S-1投与量は以下の通りである（いずれも1日2回朝夕食後の分2投与）。 BSA<1.25 m ² : 80 mg/day、1.25≦BSA<1.5 m ² : 100 mg/day、1.5 m ² ≦BSA: 120 mg/day ※現使用患者終了次第削除予定。				