

B胃がん23

対象疾患	胃がん	レジメン名	CAP+L-OHP療法 (CAPOX療法)		
1コースの期間 (休薬期間含む)		21日			
総コース数	制限なし				
Rp.	薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
1	カペシタビン (CAP)	※備考欄参照	経口		day 1~14
2	生食100 mL (ルートキープ用)	1 P	点滴静注	ゆっくり	day 1
3	生食100 mL	1 P	点滴静注	30分	day 1
	デキサメタゾン6.6 mg	1 V			
	パロノセトロン0.75 mg	1 V			
4	デキサメタゾン4 mg	2 T	経口		day 2~3 (Max day 2~4)
5	オキサリプラチン (L-OHP)	130 mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1
	デキサメタゾン1.65 mg	2 A			
	5%ブドウ糖注射液250 mL	1 P			
6	生食50 mL (フラッシュ用)	1 P	点滴静注	全開	day 1
血管外漏出 リスク分類	L-OHP: 炎症性				
催吐性リスク分類	レジメン全体: 中等度 (CAP: 軽度 L-OHP: 中等度)				
インラインフィルター の要不要	不要				
備考欄	※デキサメタゾン点滴静注の内3.3 mgは、L-OHPによる静脈炎予防のためL-OHPと混注する。 ※CAP投与量は以下の通りである (いずれも1日2回朝夕食後の分2投与) (C法)。 BSA<1.36 m ² : 2400 mg/day、1.36≦BSA<1.66 m ² : 3000 mg/day、 1.66≦BSA<1.96 m ² : 3600 mg/day、1.96 m ² ≦BSA: 4200 mg/day				