

C大腸がん13

対象疾患	大腸がん	レジメン名	Bev+CAP+L-OHP療法 (Bev+CAPOX療法)		
1コースの期間(休薬期間含む)	21日				
総コース数	制限なし				
Rp.	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	カペシタビン (CAP)	※備考欄参照	経口		day 1~14
2	生食100 mL (ルートキープ用)	1 P	点滴静注	ゆっくり	day 1
3	生食100 mL	1 P	点滴静注	30分	day 1
	デキサメタゾン6.6 mg	1 V			
	パロノセトロン0.75 mg	1 V			
4	デキサメタゾン4 mg	2 T	経口		day 2~3 (Max day 2~4)
5	ベバシズマブ (Bev)	7.5 mg/kg	点滴静注	90分	day 1
	生食100 mL	1 P		※備考欄参照	
6	オキサリプラチン(L-OHP)	130 mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1
	デキサメタゾン1.65 mg	2 A			
	5%ブドウ糖注射液250 mL	1 P			
7	生食50 mL (フラッシュ用)	1 P	点滴静注	全開	day 1
血管外漏出 リスク分類	Bev: 非炎症性 L-OHP: 炎症性				
催吐性リスク分類	レジメン全体: 中等度 (CAP: 軽度 Bev: 最小度 L-OHP: 中等度)				
インラインフィルターの 要不要	不要				
備考欄	<p>※Bevは、初回は90分かけて投与すること。初回時の忍容性が確認出来れば、2回目は60分で投与出来、さらに2回目も忍容性が確認出来れば、3回目以降30分で投与出来る。</p> <p>※デキサメタゾン点滴静注の内3.3 mgは、L-OHPによる静脈炎予防のためL-OHPと混注する。</p> <p>※CAP投与量は以下の通りである (いずれも1日2回朝夕食後の分2投与) (C法)。</p> <p>BSA<1.36 m²: 2400 mg/day、1.36≤BSA<1.66 m²: 3000 mg/day、 1.66≤BSA<1.96 m²: 3600 mg/day、1.96 m²≤BSA: 4200 mg/day</p>				