

C大腸がん20

対象疾患	大腸がん	レジメン名	Pani+CPT-11療法		
1コースの期間(休薬期間含む)	14日				
総コース数	制限なし				
Rp.	薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
1	生食100 mL(ルートキープ用)	1 P	点滴静注	ゆっくり	day 1
2	生食100 mL	1 P	点滴静注	30分	day 1
	デキサメタゾン6.6 mg	1 V			
	デキサメタゾン1.65 mg	2 A			
	パロノセトロン0.75 mg	1 V			
3	デキサメタゾン4 mg	2 T	経口		day 2~3 (Max day 2~4)
4	パニツムマブ (Pani)	6 mg/kg	点滴静注	60分	day 1
	生食100 mL	1 P ※備考欄参照			
6	イリノテカン (CPT-11)	150 mg/m ²	点滴静注	90分	day 1
	生食250 mL	1 P			
7	生食50 mL(フラッシュ用)	1 P	点滴静注	全開	day 1
血管外漏出 リスク分類	Pani: 非炎症性 CPT-11: 炎症性				
催吐性リスク分類	レジメン全体: 中等度 (Pani: 最小度 CPT-11: 中等度)				
インラインフィルター の要不要	Pani投与のため、0.2又は0.22 μmのインラインフィルターを使用				
備考欄	※Paniは、採取量と同量の生食を予め抜き取り、希釈時に本剤と生食の合計が全量100 mLとなるように希釈する。但し、1000 mgを超える投与量となる場合は全量150 mLとなるように希釈する。				