

C大腸がん22

対象疾患	大腸がん	レジメン名	Bev+S-1療法 (S-1: 4週投与2週休薬法)		
1コースの期間(休薬期間含む)	42日				
総コース数	制限なし				
Rp.	薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
1	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム (S-1)	※備考欄参照	経口		day 1~28
2	生食100 mL (ルートキープ用)	1 P	点滴静注	ゆっくり	day 1、15、29
3	ベバシズマブ (Bev)	5 mg/kg	点滴静注	90分	day 1、15、29
	生食100 mL	1 P		※備考欄参照	
4	生食50 mL (フラッシュ用)	1 P	点滴静注	全開	day 1、15、29
血管外漏出 リスク分類	Bev: 非炎症性				
催吐性リスク分類	レジメン全体:最小度 (S-1:軽度 Bev: 最小度) ※S-1は内服薬のためルーチンの制吐療法は最小度に準ずる				
インラインフィルター の要不要	不要				
備考欄	※Bevは、初回は90分かけて投与すること。初回時の忍容性が確認出来れば、2回目は60分で投与出来、さらに2回目も忍容性が確認出来れば、3回目以降30分で投与出来る。 ※S-1投与量は以下の通りである (いずれも1日2回朝夕食後の分2投与)。 BSA<1.25 m ² : 80 mg/day、1.25≦BSA<1.5 m ² : 100 mg/day、1.5 m ² ≦BSA: 120 mg/day				