

C大腸がん24

対象疾患	大腸がん	レジメン名	S-1+L-OHP療法(SOX療法)		
1コースの期間(休薬期間含む)	21日				
総コース数	制限なし				
Rp.	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム(S-1)	※備考欄参照	経口		day 1~14
2	生食100 mL(ルートキープ用)	1 P	点滴静注	ゆっくり	day 1
3	生食100 mL	1 P	点滴静注	30分	day 1
	デキサメタゾン6.6 mg	1 V			
	パロノセトロン0.75 mg	1 V			
4	デキサメタゾン4 mg	2 T	経口		day 2~3 (Max day 2~4)
5	オキサリプラチン(L-OHP)	130 mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1
	デキサメタゾン1.65 mg	2 A			
	5%ブドウ糖注射液250 mL	1 P			
6	生食50 mL(フラッシュ用)	1 P	点滴静注	全開	day 1
血管外漏出 リスク分類	L-OHP: 炎症性				
催吐性リスク分類	レジメン全体: 中等度(S-1: 軽度 L-OHP: 中等度)				
インラインフィルターの 要不要	不要				
備考欄	※デキサメタゾン点滴静注の内3.3 mgは、L-OHPによる静脈炎予防のためL-OHPと混注する。 ※S-1投与量は以下の通りである(いずれも1日2回朝夕食後の分2投与)。 BSA<1.25 m ² : 80 mg/day、1.25 ≤ BSA<1.5 m ² : 100 mg/day、1.5 m ² ≤ BSA: 120 mg/day				