

C大腸がん26

対象疾患	大腸がん	レジメン名	Bev+CAP療法		
1コースの期間(休薬期間含む)	21日				
総コース数	制限なし				
Rp.	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	カペシタビン (CAP)	※備考欄参照	経口		day 1~14
2	生食100 mL(ルートキープ用)	1 P	点滴静注	ゆっくり	day 1
3	ベバシズマブ (Bev)	7.5 mg/kg	点滴静注	90分	day 1
	生食100 mL	1 P		※備考欄参照	
4	生食50 mL(フラッシュ用)	1 P	点滴静注	全開	day 1
血管外漏出 リスク分類	Bev: 非炎症性				
催吐性リスク分類	レジメン全体:最小度(CAP: 軽度 Bev: 最小度) ※CAPは内服薬のためルーチンの制吐療法は最小度に準ずる				
インラインフィルター の要不要	不要				
備考欄	※Bevは、初回は90分かけて投与すること。初回時の忍容性が確認出来れば、2回目は60分で投与出来、さらに2回目も忍容性が確認出来れば、3回目以降30分で投与出来る。 ※CAP投与量は以下の通りである (いずれも1日2回朝夕食後の分2投与) (C法)。 BSA<1.36 m ² : 2400 mg/day、1.36≦BSA<1.66 m ² : 3000 mg/day、 1.66≦BSA<1.96 m ² : 3600 mg/day、1.96 m ² ≦BSA: 4200 mg/day				