

C大腸がん29

対象疾患	大腸がん	レジメン名	CAP+CPT-11療法 (CAPIRI療法)		
1コースの期間(休薬期間含む)		21日			
総コース数	制限なし				
Rp.	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	カペシタビン (CAP)	1600 mg/m ²	経口		day 1~14
2	生食100 mL (ルートキープ用)	1 P	点滴静注	ゆっくり	day 1
3	生食100 mL	1 P	点滴静注	30分	day 1
	デキサメタゾン6.6 mg	1 V			
	デキサメタゾン1.65 mg	2 A			
	パロノセトロン0.75 mg	1 V			
4	デキサメタゾン4 mg	2 T	経口		day 2~3 (Max day 2~4)
5	イリノテカン (CPT-11)	200 mg/m ²	点滴静注	90分	day 1
	生食250 mL	1 P			
6	生食50 mL (フラッシュ用)	1 P	点滴静注	全開	day 1
血管外漏出 リスク分類	CPT-11: 炎症性				
催吐性リスク分類	レジメン全体: 中等度 (CAP: 軽度 CPT-11: 中等度)				
インラインフィルター の要不要	不要				
備考欄	※CAP投与量は他のレジメンと異なるため注意である (1日2回朝夕食後の分2投与)。				