

C大腸がん32

対象疾患	大腸がん	レジメン名	Bev+S-1療法(S-1: 2週投与1週休薬法)		
1コースの期間(休薬期間含む)	21日				
総コース数	制限なし				
Rp.	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム(S-1)	※備考欄参照	経口		day 1~14
2	生食100 mL(ルートキープ用)	1 P	点滴静注	ゆっくり	day 1
3	ベバシズマブ(Bev)	7.5 mg/kg	点滴静注	90分 ※備考欄参照	day 1
	生食100 mL	1 P			
4	生食50 mL(フラッシュ用)	1 P	点滴静注	全開	day 1
血管外漏出 リスク分類	Bev: 非炎症性				
催吐性リスク分類	レジメン全体: 最小度(S-1: 軽度 Bev: 最小度) ※S-1は内服薬のためルーチンの制吐療法は最小度に準ずる				
インラインフィルターの 要不要	不要				
備考欄	<p>※Bevは、初回は90分かけて投与すること。初回時の忍容性が確認出来れば、2回目は60分で投与出来、さらに2回目も忍容性が確認出来れば、3回目以降30分で投与出来る。</p> <p>※S-1投与量は以下の通りである(いずれも1日2回朝夕食後の分2投与)。</p> <p>BSA<1.25 m²: 80 mg/day、1.25 ≤ BSA<1.5 m²: 100 mg/day、1.5 m² ≤ BSA: 120 mg/day</p>				