

# C大腸がん33

|                    |                                                                                                                                                  |                        |                                   |      |                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------|-----------------------|
| 対象疾患               | 大腸がん                                                                                                                                             | レジメン名                  | Pani+CAP+CPT-11療法 (Pani+CAPIRI療法) |      |                       |
| 1コースの期間(休薬期間含む)    |                                                                                                                                                  | 21日                    |                                   |      |                       |
| 総コース数              | 制限なし                                                                                                                                             |                        |                                   |      |                       |
| Rp.                | 薬剤名                                                                                                                                              | 1日投与量                  | 投与法                               | 投与時間 | 投与日                   |
| 1                  | カペシタビン (CAP)                                                                                                                                     | 1600 mg/m <sup>2</sup> | 経口                                |      | day 1~14              |
| 2                  | 生食100 mL(ルートキープ用)                                                                                                                                | 1 P                    | 点滴静注                              | ゆっくり | day 1                 |
| 3                  | 生食100 mL                                                                                                                                         | 1 P                    | 点滴静注                              | 30分  | day 1                 |
|                    | デキサメタゾン6.6 mg                                                                                                                                    | 1 V                    |                                   |      |                       |
|                    | デキサメタゾン1.65 mg                                                                                                                                   | 2 A                    |                                   |      |                       |
|                    | パロノセトロン0.75 mg                                                                                                                                   | 1 V                    |                                   |      |                       |
| 4                  | デキサメタゾン4 mg                                                                                                                                      | 2 T                    | 経口                                |      | day 2~3 (Max day 2~4) |
| 5                  | パニツムマブ (Pani)                                                                                                                                    | 6 mg/kg                | 点滴静注                              | 60分  | day 1                 |
|                    | 生食100 mL                                                                                                                                         | 1 P<br>※備考欄参照          |                                   |      |                       |
| 6                  | イリノテカン (CPT-11)                                                                                                                                  | 200 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴静注                              | 90分  | day 1                 |
|                    | 生食250 mL                                                                                                                                         | 1 P                    |                                   |      |                       |
| 7                  | 生食50 mL (フラッシュ用)                                                                                                                                 | 1 P                    | 点滴静注                              | 全開   | day 1                 |
| 血管外漏出<br>リスク分類     | Pani: 非炎症性 CPT-11: 炎症性                                                                                                                           |                        |                                   |      |                       |
| 催吐性リスク分類           | レジメン全体: 中等度 (CAP: 軽度 Pani: 最小度 CPT-11: 中等度)                                                                                                      |                        |                                   |      |                       |
| インラインフィルター<br>の要不要 | Pani投与のため、0.2又は0.22 μmのインラインフィルターを使用                                                                                                             |                        |                                   |      |                       |
| 備考欄                | ※Paniは、採取量と同量の生食を予め抜き取り、希釈時に本剤と生食の合計が全量100 mLとなるように希釈する。但し、1000 mgを超える投与量となる場合は全量150 mLとなるように希釈する。<br>※CAP投与量は他のレジメンと異なるため注意である (1日2回朝夕食後の分2投与)。 |                        |                                   |      |                       |