

C大腸がん39

対象疾患	大腸がん	レジメン名	Bev+5-FU/I-LV療法		
1コースの期間(休薬期間含む)		56日			
総コース数		制限なし			
Rp.	薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
1	生食100 mL(ルートキープ用)	1 P	点滴静注	ゆっくり	day 1、8、15、22、29、36
2	生食100 mL	1 P	点滴静注	30分	day 1、8、15、22、29、36
	デキサメタゾン6.6 mg	1 V			
3	ベバシズマブ(Bev)	5 mg/kg	点滴静注	90分 ※備考欄参照	day 1、15、29、43
	生食100 mL	1 P			
4	レボホリナート(1-LV)	250 mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1、8、15、22、29、36
	生食250 mL	1 P			
5	フルオロウラシル(5-FU)	600 mg/m ²	点滴静注	5分	day 1、8、15、22、29、36
	生食50 mL	1 P			
6	生食50 mL(フラッシュ用)	1 P	点滴静注	全開	day 1、8、15、22、29、36
血管外漏出 リスク分類	Bev: 非炎症性 5-FU: 炎症性				
催吐性リスク分類	レジメン全体:軽度(Bev:最小度 5-FU:軽度)				
インラインフィルターの 要不要	不要				
備考欄	※Bevは、初回は90分かけて投与すること。初回時の忍容性が確認出来れば、2回目は60分で投与出来、さらに2回目も忍容性が確認出来れば、3回目以降30分で投与出来る。 ※5-FUの投与は、1-LV開始1時間後に開始する。				