

C大腸がん40

対象疾患	大腸がん	レジメン名	Bev+UFT/LV療法		
1コースの期間(休薬期間含む)	28日				
総コース数	制限なし				
Rp.	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	テガフル・ウラシル(UFT)	300 mg/m ²	経口	/	day 1~21
	ホリナート(LV)	75 mg/body	経口		
2	生食100 mL(ルートキープ用)	1 P	点滴静注	ゆっくり	day 1、15
3	ベバシズマブ(Bev)	5 mg/kg	点滴静注	90分 ※備考欄参照	day 1、15
	生食100 mL	1 P			
4	生食50 mL(フラッシュ用)	1 P	点滴静注	全開	day 1、15
血管外漏出 リスク分類	Bev: 非炎症性				
催吐性リスク分類	レジメン全体:最小度(UFT:軽度 Bev: 最小度) ※UFTは内服薬のためルーチンの制吐療法は最小度に準ずる				
インラインフィルターの の要不要	不要				
備考欄	<p>※Bevは、初回は90分かけて投与すること。初回時の忍容性が確認出来れば、2回目は60分で投与出来、さらに2回目も忍容性が確認出来れば、3回目以降30分で投与出来る。</p> <p>※UFT/LVの投与は、約8時間ごとに分3投与と、食事の前後1時間を避けて経口投与すること。</p>				