

### E胆道がん3

対象疾患	胆道がん	レジメン名	GEM+CDDP療法(GC療法)		
1コースの期間(休薬期間含む)	21日				
総コース数	制限なし				
Rp.	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食100 mL(ルートキープ用)	1 P	点滴静注	ゆっくり	day 1、8
2	生食500 mL	1 P	点滴静注	60分	day 1、8
3	生食100 mL	1 P	点滴静注	30分	day 1、8
	デキサメタゾン6.6 mg	1 V			
	デキサメタゾン1.65 mg	2 A			
	パロノセトロン0.75 mg	1 V			
5	デキサメタゾン4 mg	2 T	経口		day 2~3 (Max day 2~4) day 9~10 (Max day 9~11)
6	ゲムシタビン(GEM)	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	day 1、8
	生食100 mL	1 P			
7	シスプラチン(CDDP)	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	day 1、8
	生食250 mL	1 P			
8	20%マンニトール 300 mL	0.66 V	点滴静注	30分	day 1、8
9	生食500 mL	1 P	点滴静注	60分	day 1、8
血管外漏出 リスク分類	GEM: 炎症性 CDDP: 炎症性				
催吐性リスク分類	レジメン全体: 中等度 (GEM: 軽度 CDDP: 中等度) ※本レジメンのCDDPは25 mg/m <sup>2</sup> と低用量のためリスク分類は中等度扱いとなる				
インラインフィルターの の要不要	不要				
備考欄					