

E胆道がん4

対象疾患	胆道がん	レジメン名	S-1+GEM療法 (GS療法)		
1コースの期間 (休薬期間含む)	21日				
総コース数	制限なし				
Rp.	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム (S-1)	※備考欄参照	経口		day 1~14
2	生食100 mL (ルートキープ用)	1 P	点滴静注	ゆっくり	day 1、8
3	生食100 mL	1 P	点滴静注	30分	day 1、8
	デキサメタゾン6.6 mg	1 V			
4	ゲムシタビン (GEM)	1000 mg/m ²	点滴静注	30分	day 1、8
	生食100 mL	1 P			
5	生食50 mL (フラッシュ用)	1 P	点滴静注	全開	day 1、8
血管外漏出 リスク分類	GEM: 炎症性				
催吐性リスク分類	レジメン全体: 軽度 (S-1: 軽度 GEM: 軽度)				
インラインフィルター の要不要	不要				
備考欄	※S-1投与量は以下の通りである (いずれも1日2回朝夕食後の分2投与)。 BSA<1.25 m ² : 80 mg/day、1.25≦BSA<1.5 m ² : 100 mg/day、1.5 m ² ≦BSA: 120 mg/day				