

F膵臓がん8

対象疾患		膵臓がん	レジメン名	Weekly nab-PTX+GEM療法 (GnP療法)	
1コースの期間 (休薬期間含む)			28日		
総コース数		制限なし			
Rp.	薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
1	生食100 mL (ルートキープ用)	1 P	点滴静注	ゆっくり	day 1、8、15
2	生食100 mL	1 P	点滴静注	30分	day 1、8、15
	デキサメタゾン6.6 mg	1 V			
	デキサメタゾン1.65 mg	2 A			
	パロノセトロン0.75 mg	1 V			
3	デキサメタゾン4 mg	2 T	経口		day 2~3 (Max day 2~4) day 9~10 (Max day 9~11) day 16~17 (Max day 16~18)
4	アルブミン懸濁型パクリタキセル (nab-PTX)	125 mg/m ²	点滴静注	30分	day 1、8、15
	生食100 mL	1 P ※備考欄参照			
5	ゲムシタビン (GEM)	1000 mg/m ²	点滴静注	30分	day 1、8、15
	生食100 mL	1 P			
6	生食50 mL	1 P	点滴静注	全開	day 1、8、15
血管外漏出 リスク分類		nab-PTX:壊死性 GEM: 炎症性			
催吐性リスク分類		レジメン全体: 中等度 (nab-PTX: 軽度 GEM: 軽度)			
インラインフィルター の要不要		nab-PTX投与のため、インラインフィルターは使用禁止			
備考欄		※nab-PTXは生食にて20 mL/Vで溶解するが、生食の不要な残液は破棄する。			