

## F膵臓がん9

対象疾患	膵臓がん	レジメン名	nal-IRI+5-FU/l-LV療法		
1コースの期間(休薬期間含む)	14日				
総コース数	制限なし				
Rp.	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食100 mL(ルートキープ用)	1 P	点滴静注	ゆっくり	day 1
2	生食100 mL	1 P	点滴静注	30分	day 1
	デキサメタゾン6.6 mg	1 V			
	デキサメタゾン1.65 mg	2 A			
	パロノセトロン0.75 mg	1 V			
3	デキサメタゾン4 mg	2 T	経口		day 2~3 (Max day 2~4)
4	リポソーム型イリノテカン(nal-IRI)	70 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	day 1
	生食500 mL	1 P			
5	生食50 mL(フラッシュ用)	1 P	点滴静注	全開	day 1
6	レボホリナート(1-LV)	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	day 1
	生食250 mL	1 P			
7	フルオロウラシル(5-FU)	2400 mg/m <sup>2</sup>	持続静注	46時間	day 1
	生食250 mL	※備考欄参照			
8	生食50 mL(フラッシュ用)	1 P	点滴静注	全開	day 1
血管外漏出 リスク分類	nal-IRI: 炎症性 5-FU: 炎症性				
催吐性リスク分類	レジメン全体: 中等度(nal-IRI: 中等度 5-FU: 軽度)				
インラインフィルターの 要不要	nal-IRI投与のため、インラインフィルターは <u>使用禁止</u>				
備考欄	※5-FUの持続静注分は、全量230 mLとなるように調製し、インフューザーポンプを用いて投与開始し46時間かけて投与する。				