

H乳がん22

対象疾患	乳がん	レジメン名	Weekly Tra+weekly PTX療法		
1コースの期間(休薬期間含む)	7日				
総コース数	制限なし				
Rp.	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食100 mL(ルートキープ用)	1 P	点滴静注	ゆっくり	day 1
2	ジフェンヒドラミン10 mg	5 T	経口		day 1
3	生食100 mL	1 P	点滴静注	30分	day 1
	デキサメタゾン6.6 mg	1 V			
4	トラスツズマブ(Tra)	初回4 mg/kg 2回目~2 mg/kg	点滴静注	90分 ※備考欄参照	day 1
	生食250 mL	1 P			
5	生食50 mL(フラッシュ用)	1 P	点滴静注	全開	day 1
6	ファモチジン20 mg	1 A	静注		day 1
	生食20 mL	1 A			
7	パクリタキセル(PTX)	80 mg/m ²	点滴静注	60分	day 1
	生食250 mL	1 P			
8	生食250 mL(フラッシュ用)	1 P	点滴静注	30分	day 1
血管外漏出 リスク分類	Tra: 非炎症性 PTX: 壊死性				
催吐性リスク分類	レジメン全体: 軽度(Tra: 最小度 PTX: 軽度)				
インラインフィルター の要不要	PTX投与のため、0.22 μm以下のインラインフィルターを使用				
備考欄	※Traの2回目以降は、初回時に忍容性が良好であれば投与時間を30分まで短縮可能である。 ※ジフェンヒドラミンは、PTX投与30分前に内服する。				