

## H乳がん23

対象疾患	乳がん	レジメン名	Weekly Tra+VNR療法		
1コースの期間(休薬期間含む)	21日				
総コース数	制限なし				
Rp.	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食100 mL(ルートキープ用)	1 P	点滴静注	ゆっくり	day 1、8、15
2	トラスツズマブ(Tra)	初回4 mg/kg 2回目~2 mg/kg	点滴静注	90分 ※備考欄参照	day 1、8、15
	生食250 mL	1 P			
3	ビノレルビン(VNR)	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	10分以内	day 1、8
	生食50 mL	1 P			
4	生食500 mL(フラッシュ用)	1 P	点滴静注	60分	day 1、8
5	生食50 mL(フラッシュ用)	1 P	点滴静注	全開	day 15
血管外漏出 リスク分類	Tra: 非炎症性 VNR: 壊死性 ※VNRはビンカアルカロイド系抗がん剤であり、漏出時の患部の冷罨法は禁止(潰瘍形成を促進する)。血流を増加させ薬剤を分散、希釈させるため温罨法が推奨されている。				
催吐性リスク分類	レジメン全体: 最小度 (Tra: 最小度 VNR: 最小度)				
インラインフィルター の要不要	不要				
備考欄	※Traの2回目以降は、初回時に忍容性が良好であれば投与時間を30分まで短縮可能である。				