

### H乳がん33

|                    |                                                                   |                          |                      |               |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|---------|
| 対象疾患               | 乳がん                                                               | レジメン名                    | Tri-weekly Tra+ERI療法 |               |         |
| 1コースの期間(休薬期間含む)    |                                                                   | 21日                      |                      |               |         |
| 総コース数              | 制限なし                                                              |                          |                      |               |         |
| Rp.                | 薬剤名                                                               | 1日投与量                    | 投与法                  | 投与時間          | 投与日     |
| 1                  | 生食100 mL(ルートキープ用)                                                 | 1 P                      | 点滴静注                 | ゆっくり          | day 1、8 |
| 2                  | 生食100 mL                                                          | 1 P                      | 点滴静注                 | 30分           | day 1、8 |
|                    | デキサメタゾン6.6 mg                                                     | 1 V                      |                      |               |         |
| 3                  | トラスツズマブ(Tra)                                                      | 初回8 mg/kg<br>2回目～6 mg/kg | 点滴静注                 | 90分<br>※備考欄参照 | day 1   |
|                    | 生食250 mL                                                          | 1 P                      |                      |               |         |
| 4                  | エリブリン(ERI)                                                        | 1.4 mg/m <sup>2</sup>    | 静注                   | 5分            | day 1、8 |
|                    | 生食50 mL                                                           | 0.4 P                    |                      |               |         |
| 5                  | 生食50 mL(フラッシュ用)                                                   | 1 P                      | 点滴静注                 | 全開            | day 1、8 |
| 血管外漏出<br>リスク分類     | Tra: 非炎症性 ERI:非炎症性                                                |                          |                      |               |         |
| 催吐性リスク分類           | レジメン全体:軽度(Tra: 最小度 ERI: 軽度)                                       |                          |                      |               |         |
| インラインフィルター<br>の要不要 | 不要                                                                |                          |                      |               |         |
| 備考欄                | ※Traの2回目以降は、初回時に忍容性が良好であれば投与時間を30分まで短縮可能である。<br>※ERI希釈用の生食の使用量注意。 |                          |                      |               |         |