

H乳がん34

対象疾患	乳がん	レジメン名	Bev+weekly PTX療法		
1コースの期間(休薬期間含む)		28日			
総コース数	制限なし				
Rp.	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食100 mL(ルートキープ用)	1 P	点滴静注	ゆっくり	day 1、8、15
2	ジフェンヒドラミン10 mg	5 T	経口		day 1、8、15
3	生食100 mL	1 P	点滴静注	30分	day 1、8、15
	デキサメタゾン6.6 mg	1 V			
4	ベバシズマブ(Bev)	10 mg/kg	点滴静注	90分 ※備考欄参照	day 1、15
	生食100 mL	1 P			
5	生食50 mL(フラッシュ用)	1 P	点滴静注	全開	day 1、15
6	ファモチジン20 mg	1 A	静注		day 1、8、15
	生食20 mL	1 A			
7	パクリタキセル(PTX)	90 mg/m ²	点滴静注	60分	day 1、8、15
	生食250 mL	1 P			
8	生食250 mL(フラッシュ用)	1 P	点滴静注	30分	day 1、8、15
血管外漏出 リスク分類	Bev: 非炎症性 PTX:壊死性				
催吐性リスク分類	レジメン全体:軽度(Bev: 最小度 PTX: 軽度)				
インラインフィルター の要不要	PTX投与のため、0.22 μm以下のインラインフィルターを使用				
備考欄	※Bevは、初回は90分かけて投与すること。初回時の忍容性が確認出来れば、2回目は60分で投与出来、さらに2回目も忍容性が確認出来れば、3回目以降30分で投与出来る。 ※ジフェンヒドラミンは、PTX投与30分前に内服する。				