H乳がん35

対象疾患	乳がん	レジメン名	Per+tri-weekly Tra+DTX療法		
1コースの期間(休薬期間含む)	21日				
総コース数	制限なし				
Rp.	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食100 mL(ルートキープ用)	1 P	点滴静注	ゆっくり	day 1
2	生食100 mL	1 P	点滴静注	30分	day 1
	デキサメタゾン6.6 mg	1 V			
3	ペルツズマブ(Per)	初回840 mg/body 2回目~ 420 mg/body	点滴静注	60分 ※備考欄参照	day 1
	生食250 mL	1 P			
4	トラスツズマブ(Tra)	初回8 mg/kg 2回目~ 6 mg/kg	点滴静注	90分 ※備考欄参照	day 1
	生食250 mL	1 P			
5	ドセタキセル(DTX)	75 mg/m ²	点滴静注	60分	day 1
	生食250 mL	1 P			
6	生食50 mL(フラッシュ用)	1 P	点滴静注	全開	day 1
血管外漏出 リスク分類	Per:非炎症性 Tra: 非炎症性 DTX:壊死性				
催吐性リスク分類	レジメン全体:軽度(Per: 最小度 Tra: 最小度 DTX: 軽度)				
インラインフィルター の要不要	不要				
備考欄	※Per及びTraの2回目以降は、初回時に忍容性が良好であれば投与時間を30分まで短縮可能である。				