

H乳がん38

対象疾患	乳がん	レジメン名	Tri-weekly Tra+CAP療法		
1コースの期間(休薬期間含む)	21日				
総コース数	制限なし				
Rp.	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	カペシタビン (CAP)	※備考欄参照	経口		day 1~14
2	生食100 mL(ルートキープ用)	1 P	点滴静注	ゆっくり	day 1
3	トラスツズマブ(Tra)	初回8 mg/kg 2回目~6 mg/kg	点滴静注	90分 ※備考欄参照	day 1
	生食250 mL	1 P			
4	生食50 mL(フラッシュ用)	1 P	点滴静注	全開	day 1
血管外漏出 リスク分類	Tra: 非炎症性				
催吐性リスク分類	レジメン全体:最小度(CAP:軽度 Tra:最小度) ※CAPは内服薬のためルーチンの制吐療法は最小度に準ずる				
インラインフィルターの 要不要	不要				
備考欄	<p>※Traの2回目以降は、初回時に忍容性が良好であれば投与時間を30分まで短縮可能である。</p> <p>※CAP投与量は以下の通りである(いずれも1日2回朝夕食後の分2投与)(B法)。</p> <p>BSA<1.33 m²: 3000 mg/day、1.33≦BSA<1.57 m²: 3600 mg/day、 1.57≦BSA<1.81 m²: 4200 mg/day、1.81 m²≦BSA: 4800 mg/day</p>				