

L前立腺がん9

対象疾患	前立腺がん	レジメン名	CTX+PSL療法		
1コースの期間(休薬期間含む)		21日			
総コース数	制限なし				
Rp.	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食100 mL(ルートキープ用)	1 P	点滴静注	ゆっくり	day 1
2	ジフェンヒドラミン10 mg	5 T	経口		day 1
3	生食100 mL	1 P	点滴静注	30分	day 1
	デキサメタゾン6.6 mg	1 V			
4	ファモチジン20 mg	1 A	静注		day 1
	生食20 mL	1 A			
5	カバジタキセル(CTX)	25 mg/m ²	点滴静注	60分	day 1
	生食	※備考欄参照			
6	生食50 mL(フラッシュ用)	1 P	点滴静注	全開	day 1
7	ペグフィルグラスチム3.6 mg	1 Kit	皮下注		day 2
8	プレドニゾン(PSL)	10 mg/body	経口		連日投与
血管外漏出 リスク分類	CTX:壊死性				
催吐性リスク分類	CTX:軽度				
インラインフィルター の要不要	CTX投与のため、0.2又は0.22 μmインラインフィルターを使用				
備考欄	※ジフェンヒドラミンは、CTX投与30分前に内服する。 ※CTXの補液の生食の用量は、CTXの投与量により変える必要あり。CTX投与量<25 mgとなる場合は生食100 mLとし、25 mg≤CTX投与量≤65 mgとなる場合は生食250 mLとし、65 mg<CTX投与量となる場合は生食500 mLとすること。				