

N肉腫5

対象疾患	食道がん	レジメン名	Weekly PTX単剤療法(6投2休法)		
1コースの期間(休薬期間含む)	56日				
総コース数	制限なし				
Rp.	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食100 mL(ルートキープ用)	1 P	点滴静注	ゆっくり	day 1、8、15、22、29、36
2	ジフェンヒドラミン10 mg	5 T	経口		day 1、8、15、22、29、36
3	生食100 mL	1 P	点滴静注	30分	day 1、8、15、22、29、36
	デキサメタゾン6.6 mg	1 V			
4	ファモチジン20 mg	1 A	静注		day 1、8、15、22、29、36
	生食20 mL	1 A			
5	パクリタキセル(PTX)	100 mg/m ²	点滴静注	60分	day 1、8、15、22、29、36
	生食250 mL	1 P			
6	生食250 mL(フラッシュ用)	1 P	点滴静注	30分	day 1、8、15、22、29、36
血管外漏出 リスク分類	PTX:壊死性				
催吐性リスク分類	PTX:軽度				
インラインフィルターの 要不要	PTX投与のため、0.22 μm以下のインラインフィルターを使用				
備考欄	※ジフェンヒドラミンは、PTX投与30分前に内服する。 ※血管肉腫におけるweekly PTX単剤療法は1コース56日の6投2休である。				