

O悪性神経膠腫5

対象疾患	悪性神経膠腫	レジメン名	放射線併用TMZ単剤療法(初発時、放射線併用期)		
1コースの期間(休薬期間含む)		70日※備考欄参照			
総コース数		1コース			
Rp.	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食100 mL(ルートキープ用)	1 P	点滴静注	ゆっくり	day 1~42 ※備考欄参照
2	テモゾロミド(TMZ)	75 mg/m ²	点滴静注	90分	day 1~42 ※備考欄参照
	注射用水100 mL	※備考欄参照			
	生食250 mL	1 P			
3	生食50 mL(フラッシュ用)	1 P	点滴静注	全開	day 1~42 ※備考欄参照
血管外漏出 リスク分類		TMZ:炎症性			
催吐性リスク分類		TMZ:中等度 ※TMZは中等度であるが、連日投与のため制吐療法については確立した方法はない。 適宜、5-HT ₃ 受容体拮抗薬、D ₂ 受容体拮抗薬等を用いる(メーカー回答より)			
インラインフィルターの の要不要		不要			
備考欄		※TMZは、1V当たり41 mLの注射用水で溶解すること(TMZ濃度=2.5 mg/mLとなる)。 ※放射線照射の中断により放射線治療期間が延長した場合、継続基準(好中球数1,500 /mm ³ 以上、血小板数100,000 /mm ³ 以上、脱毛、悪心嘔吐を除く非血液学的副作用(NCI-CTC Grade)がGrade 1以下)を満たしたときに限り、42日間連日投与を最長49日まで延長することができる。 ※放射線療法は線量60 Gy/30 fr/6 wで施行。但し、放射線の初回照射日はTMZ投与開始日と同日とし、最終照射もTMZの最終投与日と同日となるようにする(メーカー資料より)。			