

〇悪性神経膠腫9

対象疾患	悪性神経膠腫	レジメン名	放射線併用Bev+TMZ療法(初発時、維持療法期)		
1コースの期間(休薬期間含む)	28日				
総コース数	6コース				
Rp.	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	テモゾロミド(TMZ)	150 mg/m <sup>2</sup> ※備考欄参照	経口		day 1~5
2	生食100 mL(ルートキープ用)	1 P	点滴静注	ゆっくり	day 1、15
3	ベバシズマブ(Bev)	10 mg/kg	点滴静注	90分 ※備考欄参照	day 1、15
	生食100 mL	1 P			
4	生食50 mL(フラッシュ用)	1 P	点滴静注	全開	day 1、15
血管外漏出 リスク分類	Bev:非炎症性				
催吐性リスク分類	Bev:最小度 TMZ:中等度 ※TMZは中等度であるが、連日投与のため制吐療法については確立した方法はない。 適宜、5-HT <sub>3</sub> 受容体拮抗薬、D <sub>2</sub> 受容体拮抗薬等を用いる(メーカー回答より)				
インラインフィルターの 要不要	不要				
備考欄	<p>※TMZは分1投与とし、空腹時投与が望ましいとされる(食事により吸収阻害される)。</p> <p>※2コース目以降TMZは200 mg/m<sup>2</sup>へ増量することができる。</p> <p>※Bevは、初回は90分かけて投与すること。初回時の忍容性が確認出来れば、2回目は60分で投与出来、さらに2回目も忍容性が確認出来れば、3回目以降30分で投与出来る。</p>				