

R神経内分泌腫瘍6

対象疾患	神経内分泌腫瘍	レジメン名	Weekly STZ単剤療法		
1コースの期間(休薬期間含む)		7日			
総コース数	制限なし				
Rp.	薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
1	生食100 mL(ルートキープ用)	1 P	点滴静注	ゆっくり	day 1
2	生食500 mL	1 P	点滴静注	2時間	day 1
3	アプレピタント125 mg (day 1)、 80 mg (day 2~3) ※ホスアプレピタント未使用の場合	1 Cap	経口		day 1 (125 mg)、day 2~3 (80 mg)
4	生食100 mL	1 P	点滴静注	30分	day 1
	デキサメタゾン6.6 mg	1 V			
	デキサメタゾン1.65 mg	2 A			
	パロノセトロン0.75 mg	1 V			
	ホスアプレピタント150 mg ※アプレピタント未使用の場合	1 V			
5	デキサメタゾン4 mg	2 T	経口		day 2~4 (Max day 2~5)
6	ストレプトゾシン (STZ)	1000 mg/m ² ※備考欄参照	点滴静注	30分	day 1
	生食100 mL	1 P			
7	生食250 mL	1 P	点滴静注	60分	day 1
血管外漏出 リスク分類		STZ:炎症性			
催吐性リスク分類		STZ:高度			
インラインフィルター の要不要		不要			
備考欄	※NK ₁ 受容体拮抗薬は、ホスアプレピタント150 mg/dayをday 1またはアプレピタント125 mg/day (day 1、抗がん剤投与開始1時間~1時間30分前)、80 mg/day (day 2~3、午前中)のいずれかを投与する。 ※投与量は患者の状態により適宜増減可能であるが、1回の投与量は1500 mg/m ² を超えないこと。				