

## S腎臓がん7

対象疾患	腎臓がん	レジメン名	Nivo+Ipi療法		
1コースの期間(休薬期間含む)	21日				
総コース数	4コース				
Rp.	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食100 mL(ルートキープ用)	1 P	点滴静注	ゆっくり	day 1
2	ニボルマブ(Nivo)	240 mg/body	点滴静注	30分	day 1
	生食100 mL	1 P			
3	生食50 mL	1 P	点滴静注	30分	day 1
4	イピリムマブ(Ipi)	1 mg/kg	点滴静注	30分	day 1
	生食50 mL	0.4 P			
5	生食50 mL(フラッシュ用)	1 P	点滴静注	全開	day 1
血管外漏出 リスク分類	Nivo:非炎症性 Ipi:非炎症性				
催吐性リスク分類	レジメン全体:最小度(Nivo:最小度 Ipi:最小度)				
インラインフィルターの 要不要	Nivo、Ipi投与のため、0.2又は0.22 µmインラインフィルターを使用				
備考欄	<p>※当レジメン後のNivo単剤療法はS5のレジメンを用いること。</p> <p>※NivoとIpiの投与間隔は、30分以上あける必要があるため、Rp.3の生食50 mLの投与時間は30分としているため注意(全開で投与しないこと)。</p> <p>※Ipiの投与ラインは独立したラインを用いることとされている。</p>				