

# I肺がん14

対象疾患	非小細胞肺がん	レジメン名	CBDCA+tri-weekly PTX療法 (CP療法)		
1コースの期間 (休薬期間含む)	21日				
総コース数	6コース				
Rp.	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食100 mL (ルートキープ用)	1 P	点滴静注	ゆっくり	day 1
2	ジフェンヒドラミン10 mg	5 T	経口		day 1
3	生食100 mL	1 P	点滴静注	30分	day 1
	デキサメタゾン6.6 mg	1 V			
	デキサメタゾン1.65 mg	2 A			
	パロノセトロン0.75 mg	1 V			
4	デキサメタゾン4 mg	2 T	経口		day 2~3 (Max day 2~4)
5	ファモチジン20 mg	1 A	静注		day 1
6	パクリタキセル (PTX)	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	3時間	day 1
	生食500 mL	1 P			
7	カルボプラチン (CBDCA)	AUC 6	点滴静注	60分	day 1
	5%ブドウ糖注射液250 mL	1 P			
8	生食50 mL (フラッシュ用)	1 P	点滴静注	全開	day 1
血管外漏出 リスク分類	PTX:壊死性 CBDCA:炎症性				
催吐性リスク分類	レジメン全体:中等度 (PTX:軽度 CBDCA:中等度)				
インラインフィルターの の要否	PTX投与のため、0.22 μm以下のインラインフィルターを使用				
備考欄	※ジフェンヒドラミンは、PTX投与30分前に内服する。 ※CBDCA投与量計算は、Calvert式(投与量 <sub>(mg)</sub> =目標AUC <sub>(min・mg/mL)</sub> ×(GFR <sub>(mL/min)</sub> +25))を用いる。				