

## I肺がん16

対象疾患	非小細胞肺がん	レジメン名	CBDCA+weekly nab-PTX療法 (CnP療法)		
1コースの期間(休薬期間含む)	21日				
総コース数	6コース				
Rp.	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食100 mL (ルートキープ用)	1 P	点滴静注	ゆっくり	day 1、8、15
2	生食100 mL	1 P	点滴静注	30分	day 1、8、15
	デキサメタゾン6.6 mg	1 V			
	デキサメタゾン1.65 mg	2 A			day 1
	パロノセトロン0.75 mg	1 V			
3	デキサメタゾン4 mg	2 T	経口		day 2~3 (Max day 2~4)
4	アルブミン懸濁型パクリタキセル (nab-PTX)	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	day 1、8、15
	生食100 mL	1 P ※備考欄参照			
5	カルボプラチン (CBDCA)	AUC 6	点滴静注	60分	day 1
	5%ブドウ糖注射液250 mL	1 P			
6	生食50 mL (フラッシュ用)	1 P	点滴静注	全開	day 1、8、15
血管外漏出 リスク分類	nab-PTX:壊死性 CBDCA:炎症性				
催吐性リスク分類	レジメン全体:中等度 (nab-PTX:軽度 CBDCA:中等度)				
インラインフィルター の要不要	nab-PTX投与のため、インラインフィルターは使用禁止				
備考欄	<p>※nab-PTXは生食にて20 mL/Vで溶解するが、生食の不要な残液は破棄する。</p> <p>※CBDCA投与量計算は、Calvert式(投与量<sub>(mg)</sub>=目標AUC<sub>(min・mg/mL)</sub>×(GFR<sub>(mL/min)</sub>+25))を用いる。</p>				