

I肺がん19

対象疾患	非小細胞肺がん	レジメン名	PEM単剤療法		
1コースの期間(休薬期間含む)		21日			
総コース数	制限なし				
Rp.	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食100 mL(ルートキープ用)	1 P	点滴静注	ゆっくり	day 1
2	生食100 mL	1 P	点滴静注	30分	day 1
	デキサメタゾン6.6 mg	1 V			
3	ペメトレキセド(PEM)	500 mg/m ²	点滴静注	10分	day 1
	生食100 mL	1 P ※備考欄参照			
4	生食50 mL(フラッシュ用)	1 P	点滴静注	全開	day 1
血管外漏出 リスク分類	PEM: 非炎症性				
催吐性リスク分類	PEM: 軽度				
インラインフィルターの 要不要	不要				
備考欄	※PEMは、採取量と同量の生食を予め抜き取り、希釈時に本剤と生食の合計が全量100 mLとなるように希釈する。 ※PEM投与のため葉酸及びビタミンB ₁₂ の投与も当レジメン開始前より行うこと。葉酸は調剤用パンビタン末®を1日1回1 g(葉酸として0.5 mg相当分)を当レジメン開始7日前から連日経口投与する。ビタミンB ₁₂ は1日1回1000 μg 筋注を当レジメン開始7日前から開始し、9週間毎(3コース毎)に行う。また、当レジメン終了の際は、いずれも最終投与日から22日目まで投与すること。				