

I肺がん26

対象疾患	非小細胞肺がん	レジメン名	S-1+CDDP療法 (SP療法) (S-1: 3週投与2週休薬法)		
1コースの期間 (休薬期間含む)		35日			
総コース数	6コース				
Rp.	薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日
1	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム (S-1)	※備考欄参照	経口		day 1~21
2	生食100 mL (ルートキープ用)	1 P	点滴静注	ゆっくり	day 8
3	生食1000 mL	1 P	点滴静注	3時間	day 8
4	アブレピタント125mg (day8)、 80 mg (day9~10) ※ホスネツピタント未使用の場合	1 Cap	経口		day 8 (125 mg)、day 9~10 (80 mg)
5	生食100 mL	1 P	点滴静注	30分	day 8
	デキサメタゾン6.6 mg	1 V			
	デキサメタゾン1.65 mg	2 A			
	パロノセトロン0.75 mg	1 V			
	ホスネツピタント235 mg ※アブレピタント未使用の場合	1 V			
6	デキサメタゾン4 mg	2 T	経口		day 9~11 (Max day 9~12)
7	シスプラチン (CDDP)	60 mg/m ²	点滴静注	2時間	day 8
	生食500 mL	1 P			
8	20%マンニトール 300 mL	0.66 P	点滴静注	30分	day 8
9	フロセミド20mg	1 A	静注		day 8
10	生食1000 mL	1 P	点滴静注	6時間	day 8~10
	生食500 mL	1 P			
血管外漏出 リスク分類	CDDP: 炎症性				
催吐性リスク分類	レジメン全体: 高度 (S-1: 軽度 CDDP: 高度)				
インラインフィルター の要不要	不要				
備考欄	※Short hydration法もレジメンオーダーに登録あり。 ※NK ₁ 受容体拮抗薬は、ホスネツピタント235 mg/dayをday 8またはアブレピタント125 mg/day (day 8、抗がん剤投与開始1時間~1時間30分前)、80 mg/day (day 9~10、午前中) のいずれかを投与する。 ※CDDP総投与量500 mg/m2を超える場合は蓄積性の神経毒性注意。 ※S-1投与量は以下の通りである (いずれも1日2回朝夕食後の分2投与)。 BSA<1.25 m ² : 80 mg/day、1.25≦BSA<1.5 m ² : 100 mg/day、1.5 m ² ≦BSA: 120 mg/day				