

I肺がん31

対象疾患		非小細胞肺がん	レジメン名	放射線併用weekly CBDCA+PTX療法	
1コースの期間(休薬期間含む)			42日		
総コース数		1コース			
Rp.	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食100 mL(ルートキープ用)	1 P	点滴静注	ゆっくり	day 1、8、15、22、29、36
2	ジフェンヒドラミン10 mg	5 T	経口		day 1、8、15、22、29、36
3	生食100 mL	1 P	点滴静注	30分	day 1、8、15、22、29、36
	デキサメタゾン6.6 mg	1 V			
	デキサメタゾン1.65 mg	2 A			
	パロノセトロン0.75 mg	1 V			
4	デキサメタゾン4 mg	2 T	経口		day 2~3 (Max day 2~4) day 9~10 (Max day 9~11) day 16~17 (Max day 16~18) day 23~24 (Max day 23~25) day 30~31 (Max day 30~32) day 37~39 (Max day 37~39)
5	ファモチジン20 mg	1 A	静注		day 1、8、15、22、29、36
6	パクリタキセル(PTX)	40 mg/m ²	点滴静注	60分	day 1、8、15、22、29、36
	生食250 mL	1 P			
7	カルボプラチン(CBDCA)	AUC 2	点滴静注	60分	day 1、8、15、22、29、36
	5%ブドウ糖注射液250 mL	1 P			
8	生食50 mL(フラッシュ用)	1 P	点滴静注	全開	day 1、8、15、22、29、36
血管外漏出 リスク分類		PTX:壊死性 CBDCA:炎症性			
催吐性リスク分類		レジメン全体:中等度(PTX:軽度 CBDCA:中等度)			
インラインフィルター の要不要		PTX投与のため、0.22 μm以下のインラインフィルターを使用			
備考欄		※ジフェンヒドラミンは、PTX投与30分前に内服する。 ※CBDCA投与量計算は、Calvert式(投与量 _(mg) =目標AUC _(min・mg/mL) ×(GFR _(mL/min) +25))を用いる。 ※放射線療法はday 1~5、8~12、15~19、22~26、29~33、36~40に線量60 Gy/30 fr/6 wで施行。			