

※本レジメン集は外来化学療法加算の算定を行っているレジメンのみを掲載。  
※当加算を取れない治療法や削除となったレジメン等のため、登録記号・番号に欠番がある場合あり。

L前立腺がん1

|                    |                   |                      |         |      |       |
|--------------------|-------------------|----------------------|---------|------|-------|
| 対象疾患               | 前立腺がん             | レジメン名                | DTX単剤療法 |      |       |
| 1コースの期間(休薬期間含む)    |                   | 21日                  |         |      |       |
| 総コース数              | 制限なし              |                      |         |      |       |
| Rp.                | 薬剤名               | 1日投与量                | 投与法     | 投与時間 | 投与日   |
| 1                  | 生食100 mL(ルートキープ用) | 1 P                  | 点滴静注    | ゆっくり | day 1 |
| 2                  | 生食100 mL          | 1 P                  | 点滴静注    | 30分  | day 1 |
|                    | デキサメタゾン6.6 mg     | 1 V                  |         |      |       |
| 3                  | ドセタキセル(DTX)       | 75 mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注    | 60分  | day 1 |
|                    | 生食250 mL          | 1 P                  |         |      |       |
| 4                  | 生食50 mL(フラッシュ用)   | 1 P                  | 点滴静注    | 全開   | day 1 |
| 血管外漏出<br>リスク分類     | DTX:壊死性           |                      |         |      |       |
| 催吐性リスク分類           | DTX:軽度            |                      |         |      |       |
| インラインフィルター<br>の要不要 | 不要                |                      |         |      |       |
| 備考欄                |                   |                      |         |      |       |

L前立腺がん2

削除 LEUP単剤療法 (SR 12週毎)

L前立腺がん3

削除 LEUP単剤療法 (4週毎)

L前立腺がん4

削除 デガレリクス単剤療法 (4週毎)

L前立腺がん5

削除 GOSE単剤療法 (LA 12週毎)

L前立腺がん6

削除 GOSE単剤療法 (4週毎)

L前立腺がん7

削除 ENZ単剤療法

L前立腺がん8

削除 ABI単剤療法

# L前立腺がん9

|                    |                                                                                                                                                                  |                      |           |      |       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------|-------|
| 対象疾患               | 前立腺がん                                                                                                                                                            | レジメン名                | CTX+PSL療法 |      |       |
| 1コースの期間(休薬期間含む)    |                                                                                                                                                                  | 21日                  |           |      |       |
| 総コース数              |                                                                                                                                                                  | 制限なし                 |           |      |       |
| Rp.                | 薬剤名                                                                                                                                                              | 1日投与量                | 投与方法      | 投与時間 | 投与日   |
| 1                  | 生食100 mL(ルートキープ用)                                                                                                                                                | 1 P                  | 点滴静注      | ゆっくり | day 1 |
| 2                  | ジフェンヒドラミン10 mg                                                                                                                                                   | 5 T                  | 経口        |      | day 1 |
| 3                  | 生食100 mL                                                                                                                                                         | 1 P                  | 点滴静注      | 30分  | day 1 |
|                    | デキサメタゾン6.6 mg                                                                                                                                                    | 1 V                  |           |      |       |
| 4                  | ファモチジン20 mg                                                                                                                                                      | 1 A                  | 静注        |      | day 1 |
| 5                  | カバジタキセル(CTX)                                                                                                                                                     | 25 mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注      | 60分  | day 1 |
|                    | 生食                                                                                                                                                               | ※備考欄参照               |           |      |       |
| 6                  | 生食50 mL(フラッシュ用)                                                                                                                                                  | 1 P                  | 点滴静注      | 全開   | day 1 |
| 7                  | ペグフィルグラスチム3.6 mg                                                                                                                                                 | 1 Kit                | 皮下注       |      | day 2 |
| 8                  | プレドニゾロン(PSL)                                                                                                                                                     | 10 mg/body           | 経口        |      | 連日投与  |
| 血管外漏出<br>リスク分類     | CTX:壊死性                                                                                                                                                          |                      |           |      |       |
| 催吐性リスク分類           | CTX:軽度                                                                                                                                                           |                      |           |      |       |
| インラインフィルターの<br>要不要 | CTX投与のため、0.2又は0.22 μmインラインフィルターを使用                                                                                                                               |                      |           |      |       |
| 備考欄                | ※ジフェンヒドラミンは、CTX投与30分前に内服する。<br>※CTXの補液の生食の用量は、CTXの投与量により変える必要あり。CTX投与量<25 mgとなる場合は生食100 mLとし、25 mg≤CTX投与量≤65 mgとなる場合は生食250 mLとし、65 mg<CTX投与量となる場合は生食500 mLとすること。 |                      |           |      |       |