

※本レジメン集は外来化学療法加算の算定を行っているレジメンのみを掲載。
※当加算を取れない治療法や削除となったレジメン等のため、登録記号・番号に欠番がある場合あり。

N肉腫1
削除

IFM+DXR療法

N肉腫2
削除

DXR単剤療法

N肉腫3
削除

DXR単剤療法(3日間投与法)

N肉腫4
削除

IFM単剤療法

N肉腫5

対象疾患		食道がん	レジメン名	Weekly PTX単剤療法(6投2休法)		
1コースの期間(休薬期間含む)			56日			
総コース数		制限なし				
Rp.	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	
1	生食100 mL(ルートキープ用)	1 P	点滴静注	ゆっくり	day 1、8、15、22、29、36	
2	ジフェンヒドラミン10 mg	5 T	経口		day 1、8、15、22、29、36	
3	生食100 mL	1 P	点滴静注	30分	day 1、8、15、22、29、36	
	デキサメタゾン6.6 mg	1 V				
4	ファモチジン20 mg	1 A	静注		day 1、8、15、22、29、36	
5	パクリタキセル(PTX)	100 mg/m ²	点滴静注	60分	day 1、8、15、22、29、36	
	生食250 mL	1 P				
6	生食250 mL(フラッシュ用)	1 P	点滴静注	30分	day 1、8、15、22、29、36	
血管外漏出 リスク分類		PTX:壊死性				
催吐性リスク分類		PTX:軽度				
インラインフィルター の要不要		PTX投与のため、0.22 μm以下のインラインフィルターを使用				
備考欄		※ジフェンヒドラミンは、PTX投与30分前に内服する。 ※血管肉腫におけるweekly PTX単剤療法は1コース56日の6投2休である。				