- ※本レジメン集は外来化学療法加算の算定を行っているレジメンのみを掲載。 ※当加算を取れない治療法や削除となったレジメン等のため、登録記号・番号に欠番がある場合あり。

Y MSI-High固形がん1

対象疾患		MSI-High固形がん	レジメン名	レジメン名 Pembro単剤療法(3週間隔法)				
1コースの期間(休薬期間含む)			21日					
総コ	ース数	制限なし						
Rp.		薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日		
1	生食100 mL(ルートキープ用)		1 P	点滴静注	ゆっくり	day 1		
2	ペムブロリズマブ (Pembro)		200 mg/body	点滴静注	30分	day 1		
	生食100 mL		1 P					
3	生食50 mL((フラッシュ用)	1 P	点滴静注	全開	day 1		
血管外漏出 リスク分類			Pembro: 非炎症性					
催吐性リスク分類		Pembro:最小度						
インラインフィルター の要不要 Pembro投与のため、0.2~5 μmインラインフィルターを使用								
	備考欄							

Y MSI-High固形がん2

対象疾患		MSI-High固形がん	レジメン名	・ジメン名 Pembro単剤療法(6週間隔法)				
1コースの期間(休薬期間含む)			42日					
総コ	ース数	制限なし						
Rp.		薬剤名	1日投与量	投与法	投与時間	投与日		
1	生食100 mL(ルートキープ用)		1 P	点滴静注	ゆっくり	day 1		
2	ペムブロリズマブ (Pembro)		400 mg/body	- 点滴静注	30分	day 1		
	生食100 mL		1 P					
3	生食50 mL((フラッシュ用)	1 P	点滴静注	全開	day 1		
血管外漏出 リスク分類			Pembro:非炎症性					
催吐性リスク分類		Pembro:最小度						
インラインフィルター の要不要 Pembro投与のため、0.2~5 μmインラインフィルターを使用								
	備考欄							