

※本レジメン集は外来化学療法加算の算定を行っているレジメンのみを掲載。
※当加算を取れない治療法や削除となったレジメン等のため、登録記号・番号に欠番がある場合あり。

Y MSI-High固形がん1

対象疾患	MSI-High固形がん		レジメン名	Pembro単剤療法(3週間隔法)		
1コースの期間(休薬期間含む)			21日			
総コース数		制限なし				
Rp.	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	
1	生食100 mL(ルートキープ用)	1 P	点滴静注	ゆっくり	day 1	
2	ペムブロリズマブ(Pembro)	200 mg/body	点滴静注	30分	day 1	
	生食100 mL	1 P				
3	生食50 mL(フラッシュ用)	1 P	点滴静注	全開	day 1	
血管外漏出 リスク分類		Pembro:非炎症性				
催吐性リスク分類		Pembro:最小度				
インラインフィルターの 要不要		Pembro投与のため、0.2～5 μmインラインフィルターを使用				
備考欄						

Y MSI-High固形がん2

対象疾患	MSI-High固形がん	レジメン名	Pembro単剤療法(6週間隔法)		
1コースの期間(休薬期間含む)		42日			
総コース数	制限なし				
Rp.	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日
1	生食100 mL(ルートキープ用)	1 P	点滴静注	ゆっくり	day 1
2	ペムブロリズマブ(Pembro)	400 mg/body	点滴静注	30分	day 1
	生食100 mL	1 P			
3	生食50 mL(フラッシュ用)	1 P	点滴静注	全開	day 1
血管外漏出 リスク分類	Pembro:非炎症性				
催吐性リスク分類	Pembro:最小度				
インラインフィルター の要不要	Pembro投与のため、0.2～5 μmインラインフィルターを使用				
備考欄					

Y MSI-High固形がん3

対象疾患		MSI-High固形がん		レジメン名		Nivo+Ipi療法	
1コースの期間(休薬期間含む)				21日			
総コース数		4コース					
Rp.	薬剤名		1日投与量	投与法	投与時間	投与日	
1	生食100 mL (ルートキープ用)		1 P	点滴静注	ゆっくり	day 1	
2	ニボルマブ (Nivo)		240 mg/body	点滴静注	30分	day 1	
	生食100 mL		1 P				
3	生食50 mL		1 P	点滴静注	30分	day 1	
4	イピリムマブ (Ipi)		1 mg/kg	点滴静注	30分	day 1	
	生食50 mL		0.4 P				
5	生食50 mL (フラッシュ用)		1 P	点滴静注	全開	day 1	
血管外漏出 リスク分類		Nivo: 非炎症性 Ipi: 非炎症性					
催吐性リスク分類		レジメン全体: 最小度 (Nivo: 最小度 Ipi: 最小度)					
インラインフィルター の要不要		Nivo、Ipi投与のため、0.2又は0.22 μmインラインフィルターを使用					
備考欄		※当レジメンは2026年5月現在で、「治癒切除不能な進行・再発のMSI-Highを有する <u>直腸・結腸がん</u> 」のみに適応あり。 ※当レジメン後のNivo単剤療法はY4 Nivo単剤療法(2週間隔法)又はY5 Nivo単剤療法(4週間隔法)のレジメンを用いること。 ※NivoとIpiの投与間隔は、30分以上あける必要があるため、Rp.3の生食50 mLの投与時間は30分としているため注意(全開で投与しないこと)。					

Y MSI-High固形がん4

対象疾患	MSI-High固形がん		レジメン名	Nivo単剤療法(2週間隔法)		
1コースの期間(休薬期間含む)			14日			
総コース数		制限なし				
Rp.	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	
1	生食100 mL(ルートキープ用)	1 P	点滴静注	ゆっくり	day 1	
2	ニボルマブ(Nivo)	240 mg/body	点滴静注	30分	day 1	
	生食100 mL	1 P				
3	生食50 mL(フラッシュ用)	1 P	点滴静注	全開	day 1	
血管外漏出 リスク分類		Nivo:非炎症性				
催吐性リスク分類		Nivo:最小度				
インラインフィルターの 要不要		Nivo投与のため、0.2又は0.22 μmインラインフィルターを使用				
備考欄		※当レジメンは2026年5月現在で、「治癒切除不能な進行・再発のMSI-Highを有する直腸・結腸がん」のみに適応あり。				

Y MSI-High固形がん5

対象疾患	MSI-High固形がん		レジメン名	Nivo単剤療法(4週間隔法)		
1コースの期間(休薬期間含む)			28日			
総コース数		制限なし				
Rp.	薬剤名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	
1	生食100 mL(ルートキープ用)	1 P	点滴静注	ゆっくり	day 1	
2	ニボルマブ(Nivo)	480 mg/body	点滴静注	30分	day 1	
	生食100 mL	1 P				
3	生食50 mL(フラッシュ用)	1 P	点滴静注	全開	day 1	
血管外漏出 リスク分類		Nivo:非炎症性				
催吐性リスク分類		Nivo:最小度				
インラインフィルターの 要不要		Nivo投与のため、0.2又は0.22 μmインラインフィルターを使用				
備考欄		※当レジメンは2026年5月現在で、「治癒切除不能な進行・再発のMSI-Highを有する直腸・結腸がん」のみに適応あり。				